



ornithomedia.com
le web de l'ornithologie

Liste commentée des espèces d'oiseaux observées dans le nord-est de la Pologne en mai 2025

Total : 141 espèces.

Voir également le rapport eBird (<https://ebird.org/tripreport/355931>) pour les localisations précises de toutes les observations.

- Oie cendrée (*Anser anser*) : un grand groupe sur le réservoir de sur le réservoir de à Siemianówka et plusieurs vols en passage au-dessus de différents sites autour du parc national de la Biebrza.
- Cygne tuberculé (*Cygnus olor*) : petit groupe familial sur le réservoir de à Siemianówka, et plusieurs familles aux étangs de Dojlidy près de Białystok.
- Cygne chanteur (*Cygnus cygnus*) : observation en passage d'un couple dans un champ près de Narew en route vers Biebrza.
- Canard souchet (*Spatula clypeata*) : un mâle au sein d'un groupe de Canards colverts à Dojlidy.
- Canard chipeau (*Mareca strepera*) : petits groupes sur le réservoir de Siemianówka et à Dojlidy.

- Canard colvert (*Anas platyrhynchos*) : comme toujours, le canard d'eau douce par défaut, observé quotidiennement partout où de l'eau libre était présente.
- Perdrix grise (*Perdix perdix*) : un individu entendu au crépuscule à l'extérieur de Łoje-Awissa.
- Faisan de Colchide (*Phasianus colchicus*) : deux individus observés sur la route depuis Varsovie.
- Pigeon biset domestique (*Columba livia* var. *domestica*) : petits groupes autour des zones habitées de Biebrza, ainsi qu'un individu isolé volant en formation en V avec un petit groupe d'Oies cendrées.
- Pigeon colombin (*Columba oenas*) : un individu entendu uniquement à Kosy Most.
- Pigeon ramier (*Columba palumbus*) : commun dans tout habitat comportant de grands arbres.
- Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*) : observée sporadiquement dans les villages de la région.
- Coucou gris (*Cuculus canorus*) : l'une des espèces les plus communes du voyage, vue et surtout entendue sur presque tous les sites.
- Martinet noir (*Apus apus*) : observé quotidiennement en petits nombres.
- Râle des genêts (*Crex crex*) : nombreux au coucher du soleil dans les prairies humides à l'extérieur de Narew, dont au moins un individu approché à moins de trois mètres mais uniquement visible via caméra thermique. Deux individus également entendus depuis la tour d'observation des prairies de Narewka.

- Foulque macroule (*Fulica atra*) : après deux jours à remarquer leur absence dans les zones humides, nous avons finalement rencontré un groupe aux étangs de Dojlidy.
- Grue cendrée (*Grus grus*) : observée et entendue quotidiennement, particulièrement dans les habitats ouverts autour de la rivière Biebrza.
- Petit Gravelot (*Charadrius dubius*) : un couple sur les rives du réservoir de Siemianówka.
- Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*) : observé quotidiennement dans les habitats ouverts, notamment autour de Łoje-Awissa et Mścichy.
- Courlis cendré (*Numenius arquata*) : un individu entendu le soir et un autre observé le lendemain matin à Łoje-Awissa.
- Barge à queue noire (*Limosa limosa*) : grand groupe en alimentation dans un champ sur la route de Łoje-Awissa.
- Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*) : individus en parade crépusculaire à Kosy Most, Narew et Mścichy.
- Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*) : observée de manière limitée mais régulièrement entendue en vol nuptial (« bêlement ») dans les zones humides ouvertes.
- Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*) : individus isolés à Kosy Most, sur le réservoir de Siemianówka et Goniądz.

- Chevalier culblanc (*Tringa ochropus*) : quelques individus perchés dans les arbres au niveau du pont de Budy.
- Chevalier sylvain (*Tringa glareola*) : plusieurs individus sur les rives du réservoir de Siemianówka et dans diverses zones humides du parc national de la Biebrza.
- Chevalier gambette (*Tringa totanus*) : quelques individus sur le réservoir de à Siemianówka et relativement commun autour de Biebrza.
- Combattant varié (*Calidris pugnax*) : petit groupe sur le réservoir de à Siemianówka et trio en passage à Łoje-Awissa.
- Mouette rieuse (*Chroicocephalus ridibundus*) : un individu mêlé aux sternes sur le réservoir de à Siemianówka, et une petite colonie nicheuse à Dojlidy.
- Goéland pontique (*Larus cachinnans*) : un individu de 2e cycle à Dojlidy.
- Guifette moustac (*Chlidonias hybrida*) : environ la moitié d'un grand rassemblement mixte de sternes sur le réservoir de Siemianówka.
- Guifette noire (*Chlidonias niger*) : légèrement moins nombreuse que la précédente dans le même site.
- Guifette leucoptère (*Chlidonias leucopterus*) : la plus rare mais aussi la plus spectaculaire des guifettes sur le réservoir de Siemianówka.
- Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*) : quelques couples sur le réservoir de Siemianówka et Dojlidy.
- Petit Grèbe (*Tachybaptus ruficollis*) : un couple sur els étangs piscicoles de Dojlidy.

- Grèbe jougris (*Podiceps grisegena*) : chaque étang de la pisciculture de Dojlidy accueillait un ou plusieurs couples.
- Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*) : un couple en parade et un groupe sur différents étangs piscicoles de Dojlidy.
- Cigogne noire (*Ciconia nigra*) : deux individus en vol au-dessus du point d'observation de Goniądz.
- Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*) : très abondante, avec des nids dans chaque village visité, y compris juste devant notre fenêtre à Białowieża. Malgré d'autres espèces recherchées, il s'agit probablement de l'oiseau le plus emblématique de la région.
- Cormoran grand (*Phalacrocorax carbo*) : trois individus en passage sur les étangs de Dojlidy.
- Grande Aigrette (*Ardea alba*) : un individu en passage à Mścichy.
- Héron cendré (*Ardea cinerea*) : quelques individus sur le réservoir de Siemianówka et de nombreux passages matinaux à Łoje-Awissa.
- Balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*) : un couple en chasse sur le réservoir de Siemianówka.
- Aigle pomarin (*Clanga pomarina*) : individus observés autour de Białowieża, notamment depuis le point d'observation au nord du parc du Palais.
- Aigle criard (*Clanga clanga*) : un individu en vol depuis la plateforme de Goniądz, nécessitant une analyse photo pour le distinguer de l'Aigle pomarin.

- Épervier d'Europe (*Accipiter nisus*) : individus isolés dans la forêt à Białowieża.
- Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*) : observé quotidiennement mais en faible nombre au-dessus des zones humides ouvertes.
- Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*) : un couple en chasse en soirée à Mścichy.
- Busard cendré (*Circus pygargus*) : plusieurs individus autour de Biebrza, dont un couple observé en accouplement depuis la plateforme de Goniądz.
- Milan noir (*Milvus migrans*) : observations isolées en transit entre et vers Varsovie.
- Pygargue à queue blanche (*Haliaeetus albicilla*) : un individu sur le réservoir de Siemianówka et un couple en passage à Goniądz.
- Buse variable (*Buteo buteo*) : observée quotidiennement dans les zones ouvertes et en bord de route.
- Chevêchette d'Europe (*Glaucidium passerinum*) : rencontre chanceuse avec un mâle en chasse sur le sentier Budy-Leśne. Le « timing » était toutefois moins favorable, car une visite guidée vers un nid avait été organisée plus tard dans la soirée, offrant finalement de meilleures observations.
- Hibou moyen-duc (*Asio otus*) : observation distante d'un individu en chasse juste avant le coucher du soleil à Mścichy.
- Huppe fasciée (*Upupa epops*) : un individu sur la route en sortie de Łoje-Awissa.

- Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*) : deux individus très vocaux autour de Białowieża.
- Pic à dos blanc (*Dendrocopos leucotos*) : un mâle tambourinant au niveau du pont d Budy et un autre individu brièvement observé sur le sentier Budy-Leśne.
- Pic épeiche (*Dendrocopos major*) : omniprésent dans la région.
- Pic cendré (*Picus canus*) : un individu entendu uniquement depuis la tour de Narewka.
- Pic vert (*Picus viridis*) : un individu entendu dans le parc du Palais à Białowieża.
- Pic noir (*Dryocopus martius*) : observé et entendu à plusieurs reprises autour de Białowieża.
- Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) : étonnamment rare, un seul individu en fin de séjour autour de Biebrza.
- Lorient d'Europe (*Oriolus oriolus*) : individus chanteurs à Kosy Most et autour des étangs de Dojlidy.
- Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*) : un individu chanteur à Kosy Most.
- Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*) : un individu en passage vers Białowieża.
- Geai des chênes (*Garrulus glandarius*) : individus relativement fréquents autour de Białowieża.
- Pie bavarde (*Pica pica*) : individus ou couples dans les zones ouvertes autour de Varsovie, autour des étangs de Dojlidy et dans le parc national de la Biebrza

- Corneille noire (*Corvus frugilegus*) : commune dans les zones ouvertes et agricoles, mais absente de Białowieża.
- Corneille mantelée (*Corvus cornix*) : commune dans les zones ouvertes et urbaines, mais absente de Białowieża.
- Grand Corbeau (*Corvus corax*) : seul grand corvidé observé ou entendu à Białowieża.
- Mésange boréale (*Poecile montanus*) : entendue et vue en petits groupes à Białowieża.
- Mésange nonnette (*Poecile palustris*) : observée quotidiennement à Białowieża.
- Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus*) : rare autour de Białowieża, où la sous-espèce nominale à tête blanche est présente.
- Mésange bleue (*Cyanistes caeruleus*) : observée quotidiennement mais en petit nombre.
- Mésange charbonnière (*Parus major*) : fréquente mais pas particulièrement abondante à Białowieża.
- Roitelet huppé (*Regulus regulus*) : relativement commun dans les zones de pins.
- Roitelet à triple bandeau (*Regulus ignicapilla*) : quelques individus chanteurs autour de Białowieża.
- Sittelle torchepot (*Sitta europaea*) : relativement commune à Białowieża.

- Grimpereau des bois (*Certhia familiaris*) : deux couples dans le parc du Palais et près de la tour de Narewka.
- Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*) : moins abondant que prévu en forêt, mais des chanteurs dispersés étaient présents.
- Étourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*) : nombreux dans les lisières et les zones ouvertes.
- Grive draine (*Turdus viscivorus*) : un individu au niveau du parking de Kosy Most lors de deux visites.
- Grive musicienne (*Turdus philomelos*) : commune et très souvent entendue à Białowieża.
- Grive litorne (*Turdus pilaris*) : quelques individus dans les zones ouvertes, surtout posés sur les fils électriques.
- Gobemouche gris (*Muscicapa striata*) : plusieurs couples dans le parc du Palais et un individu à Kosy Most.
- Rougegorge familier (*Erithacus rubecula*) : quelques chanteurs discrets dans la plupart des sites de Białowieża.
- Rossignol progré (*Luscinia luscinia*) : très commun et bruyant, surtout à Kosy Most.
- Gorgebleue à miroir (*Luscinia svecica*) : un individu entendu après la tombée de la nuit à Łoje-Awissa.

- Gobemouche nain (*Ficedula parva*) : un mâle chanteur dès le premier jour, puis réobservé plus tard.
- Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*) : un mâle chanteur dans un parc de Drohiczyn, plusieurs individus dans le parc du Palais et près de Narewka.
- Gobemouche à collier (*Ficedula albicollis*) : relativement commun dans les zones forestières de Białowieża.
- Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*) : quelques individus en lisière de villages.
- Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*) : commun sur les bâtiments et dans les villages.
- Tarier des prés (*Saxicola rubetra*) : commun dans les zones humides ouvertes.
- Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*) : un individu à Łoje-Awissa.
- Accenteur mouchet (*Prunella modularis*) : quelques individus discrets en lisière forestière.
- Moineau domestique (*Passer domesticus*) : étonnamment localisé, sauf dans les villages de Budy et de Teremiski, où il est abondant.
- Moineau friquet (*Passer montanus*) : régulier dans les habitats semi-ouverts.
- Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*) : commune dans les habitats humides ouverts.

- Bergeronnette citrine (*Motacilla citreola*) : un mâle remarquable dans les bassins aménagés du restaurant Dwór Bartla à Goniądz.
- Bergeronnette grise (*Motacilla alba*) : commune dans tous les habitats sauf dans la forêt dense de Białowieża.
- Pipit rousseline (*Anthus campestris*) : un individu en comportement de nidification entre Brychy et Pluty.
- Pipit farlouse (*Anthus pratensis*) : quelques individus dans les habitats ouverts à proximité du parc de la Biebrza.
- Pipit à gorge rousse (*Anthus cervinus*) : un groupe de six individus en plumage nuptial à Łoje-Awissa.
- Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*) : omniprésent et très commun.
- Grosbec casse-noyaux (*Coccothraustes coccothraustes*) : relativement commun à Białowieża mais discret.
- Roselin cramoisi (*Carpodacus erythrinus*) : un mâle dans les étangs de Dojlidy.
- Verdier d'Europe (*Chloris chloris*) : peu commun mais observé quotidiennement.
- Linotte mélodieuse (*Linaria cannabina*) : quelques individus sur la route depuis Varsovie.
- Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*) : individus isolés dans la plupart des sites de Białowieża.

- Serin cini (*Serinus serinus*) : individus rares et dispersés.
- Bruant jaune (*Emberiza citrinella*) : commun et bien visible en prairies ouvertes.
- Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*) : deux mâles chanteurs à Brychy, sur un site désormais presque unique dans la région.
- Bruant des roseaux (*Emberiza schoeniclus*) : commun dans les habitats humides à roseaux.

Espèces non observées

- Gélinotte des bois (*Tetrastes bonasia*) : présente dans la forêt de Białowieża mais très discrète et difficile à observer ; tentative de recherche infructueuse.
- Limicoles, râles et butors : plusieurs espèces manquées, probablement en raison de la sécheresse extrême (niveau d'eau environ 1 m sous la normale dans le parc de la Biebrza).
- Pic tridactyle (*Picoides tridactylus*) : Un tambourinement lointain entendu depuis le pont de Budy pourrait être celui de cette espèce, mais nous n'avons pas pu exclure le Pic noir. Il est généralement considéré comme le plus difficile à observer parmi les pics recherchés dans la forêt de Białowieża, surtout au début du mois de mai, lorsque la plupart des oiseaux couvent leurs œufs ; faire appel à un guide local connaissant bien les territoires de nidification serait probablement utile si ce pic est une espèce que vous souhaitez absolument observer.
- Autres pics : Malgré la réputation de la forêt de Białowieża d'être le paradis des pics, ils étaient assez difficiles à trouver, en dehors du Pic épeiche. Nous n'avons dénombré que quelques individus de chacune de nos espèces cibles (Pics à dos blanc, cendré et noir) et avons complètement manqué les Pics épeichette et mar. Nous avons également raté le Pic syriaque à Drohiczyn, sur la route de Białowieża, une zone où il est parfois signalé. L'activité des pics dans la forêt de Białowieża semble culminer plus tôt, de la fin mars à la mi-avril, période durant laquelle la plupart des espèces tambourinent activement et creusent leurs nids.

- Rousserolle des buissons (*Acrocephalus dumetorum*) : espèce principalement d'Asie centrale, son aire de reproduction s'étend jusqu'à l'est de la Pologne. Elle est présente moins d'une fois par an aux alentours de la forêt de Białowieża et n'est généralement pas observée avant la fin mai.
- Pouillot verdâtre (*Phylloscopus trochiloides*) : comme la Rousserolle des buissons, l'aire de reproduction de cette espèce orientale atteint à peine la forêt de Białowieża, où la plupart des observations ont lieu entre la fin mai et juin.